

# Azhdarcho lancicollis

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'**azdarco** (***Azhdarcho lancicollis***) è un rettile volante estinto, appartenente agli pterosauri. Visse nel Cretaceo superiore (Turoniano – Coniaciano, circa 90 milioni di anni fa). I suoi resti sono stati ritrovati in Asia centrale (Uzbekistan).

## Indice

**Descrizione**

**Classificazione**

**Stile di vita**

**Bibliografia**

**Altri progetti**

**Collegamenti esterni**

## Descrizione

Conosciuto per elementi sparsi dello scheletro, questo pterosauro era caratterizzato principalmente dall'enorme sviluppo delle vertebre cervicali (da qui l'epiteto specifico *lancicollis*, che significa "dal collo a lancia"). Queste vertebre erano eccezionalmente allungate e si articolavano fra loro in una maniera piuttosto rigida. Le ali, benché poco note, dovevano essere piuttosto ampie e l'apertura alare dell'animale doveva superare gli otto metri.

## Classificazione

Descritto per la prima volta nel 1984 da L. A. Nessel, questo pterosauro è stato inizialmente accostato agli pteranodontidi (Pteranodontidae), principalmente a causa delle dimensioni e della forma slanciata delle vertebre. Nessel notò che anche altri pterosauri possedevano caratteristiche simili, e conìò per queste forme la sottofamiglia **Azhdarchinae**, che comprendeva anche *Quetzalcoatlus* e *Arambourgiania* (allora noto come *Titanopteryx*). In seguito, altri autori riconobbero lo *status* di famiglia agli azdarchidi, a causa delle rilevanti differenze rispetto agli pteranodontidi. Il nome *Azhdarcho* deriva da quello di un drago della mitologia uzbeca.

## Stile di vita



Nella descrizione originale di *Azhdarcho*, Nesselman mise in luce la particolare articolazione delle vertebre; queste dovevano conferire una mobilità molto limitata al collo, e l'animale non poteva ruotarlo ma solo alzarlo e abbassarlo. Nesselman ipotizzò quindi che gli azhdarchidi si nutrissero in modo molto simile agli odierni becchi a forbice (gen. *Rynchops*): i loro colli lunghi permettevano alla testa di trovare le prede sott'acqua senza doversi immergere completamente. Recenti ricerche, in ogni caso, hanno dimostrato che un'attività simile richiede un notevole dispendio di energia e alcune specializzazioni anatomiche di cui gli azhdarchidi erano sprovvisti.

È possibile che *Azhdarcho* e i suoi parenti cacciassero piccoli animali volatori; lo stesso Nesselman, in ogni caso, era convinto che questi animali, per poter volare, dovevano vivere in un ambiente dove i venti erano moderati o assenti.



## Bibliografia

---

- Nesselman, L. A. (1984). ["Upper Cretaceous pterosaurs and birds from Central Asia."] *Paleontologicheskii Zhurnal*, 1984(1), 47-57.
- Unwin, David M. (2006). *The Pterosaurs: From Deep Time*. New York: Pi Press. p. 273. ISBN 0-13-146308-X.
- Humphries, S., Bonser, R.H.C., Witton, M.P., and Martill, D.M. (2007). "Did pterosaurs feed by skimming? Physical modelling and anatomical evaluation of an unusual feeding method." *PLoS Biology*, 5(8): e204.

## Altri progetti

---

-  **Wikimedia Commons** (<https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it>) contiene immagini o altri file su **Azhdarcho lancicollis** (<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Azhdarcho?uselang=it>)
-  **Wikispecies** (<https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it>) contiene informazioni su **Azhdarcho lancicollis** (<https://species.wikimedia.org/wiki/Azhdarcho?uselang=it>)

## Collegamenti esterni

---

- 
- (EN)  *Azhdarcho lancicollis*, su *Fossilworks.org*.

---

Estratto da "[https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Azhdarcho\\_lancicollis&oldid=109040900](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Azhdarcho_lancicollis&oldid=109040900)"

---

**Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 23 nov 2019 alle 00:20.**

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.